

Opatření na eliminaci šíření račího moru (*Aphanomyces astaci*)

Veškeré práce je třeba realizovat tak, aby bylo vyloučeno zavlečení račího moru. V případě, že je v rámci realizace akce třeba zasahovat do koryta toku či do jiné vodní plochy s výskytem původních druhů raků či do jejího bezprostředního okolí (popř. do koryta toku či vodní plochy, v jejichž povodí nelze výskyt autochtonních druhů raků vyloučit), doporučuje se:

- používat vybavení (včetně techniky) a pomůcky, které prokazatelně nebyly v kontaktu s vodou či sedimenty z lokalit, kde hrozí výskyt račího moru (lokality s výskytem nepůvodních raků, lokality s výskytem původních raků, kde existuje podezření na výskyt nákazy apod.);
- v případě, kdy výše uvedené nelze 100 % zajistit, je třeba použít buďto vybavení a pomůcky nové (ideální situace) nebo takové, které nebylo dlouhodoběji (minimálně měsíc) na podobné lokalitě použito (a bylo během tohoto období dokonale vysušeno). Drobné pomůcky a vybavení (holiny, pracovní nástroje apod. je vhodné z preventivních důvodů před použitím dezinfikovat, např. Savem).
- v případě, že se na lokalitě, kde je realizován zásah, vyskytují invazní druhy raků nebo zde hrozí výskyt patogenu račího moru v populacích autochtonních druhů, je třeba všemi prostředky eliminovat možný export patogenu na jiné lokality (nelze přesouvat vybavení, popř. pomůcky na jiné lokality bez předchozí dezinfekce či vysušení a odstávky (min. měsíc), nelze převážet např. sediment či těžný substrát do blízkosti toků s výskytem autochtonních druhů raků apod.).